



DISTRICT OF COLUMBIA

OFFICE OF THE STATE SUPERINTENDENT OF

EDUCATION

## 抗原检测后返校标准

此类抗原检测为额外保障，以检查寒假后返校学生未患有 COVID-19/冠状病毒。阴性抗原检测必须经阴性聚合酶链反应 (PCR) 检测来确认，除非学生快速检测结果呈阴性，没有症状且为非密切接触者。请仔细遵循此类步骤。

如何使用本文件：		
红色：停止！请勿返校	黄色：需遵循附加步骤	绿色：可安全返校

**步骤 1：进行检测。** 请参阅检测试剂盒的说明，并仔细按照说明进行操作。

### 步骤 2A：如果结果呈阳：请勿返校

• 经网址 [coronavirus.dc.gov/overthecounter](https://coronavirus.dc.gov/overthecounter) 向哥伦比亚特区卫生部 (DC Health) 记录结果，并将阳性结果告知您的学校。

- 如果学生有 COVID-19/冠状病毒症状：自症状开始之日起，隔离至少 10 天。
- 如果学生没有 COVID-19/冠状病毒症状：自其检测之日起，隔离至少 10 天。

### 步骤 2B：如果结果呈阴：在返校之前，请采取以下步骤

请注意：已经被要求进行隔离的学生在规定的隔离期结束前 **不得** 返学，即使其抗原检测结果呈阴性。

此类步骤中有许多涉及额外检测。请访问 [Coronavirus.dc.gov/testing](https://Coronavirus.dc.gov/testing)，查询随到随测检测点，或访问 [testyourself.dc.gov](https://testyourself.dc.gov)，了解提供免费随取随用 PCR 检测试剂盒的图书馆和娱乐中心名单。

• 经网址 [coronavirus.dc.gov/overthecounter](https://coronavirus.dc.gov/overthecounter) 向 DC Health 记录呈阴结果。

- 如果学生有 COVID-19/冠状病毒症状：进行 PCR 检测以确认。
- 如果学生未全剂量接种疫苗，并且与被确诊患有 COVID-19/冠状病毒的人员有过密切接触：进行隔离并在最后一次接触日期至少 5-7 天后进行 PCR 检测以确认。<sup>1</sup>
- 如果学生未全剂量接种疫苗，并且有家庭成员患病：请居家，除非该家庭成员 PCR 检测呈阴性。<sup>1</sup>
- 如果学生未全剂量接种疫苗，并曾前往哥伦比亚特区、马里兰州或弗吉尼亚州以外的任何地方：建议在返回哥伦比亚特区至少 3-5 天后进行 PCR 检测以确认。

- 如果学生没有症状，也没有 COVID-19/冠状病毒已知接触：立即返校。

所有学生，无论其疫苗接种状况如何，如果出现新的或无法解释的 COVID-19/冠状病毒症状，在无 PCR 检测呈阴性或医疗保健提供者提供的其他诊断文件的情况下，**不得入校**。

如果有症状的学生未提供 PCR 检测呈阴结果或来自医疗保健提供者的证明文件，则该学生在症状开始后，以及在未使用退烧药（如 Motrin, Tylenol）的情况下，发烧已经退去至少 24 小时并且症状已有改善后，至少 10 天内 **不得入校**。

<sup>1</sup> 曾患有 COVID-19/冠状病毒并在过去 90 天内康复的学生和已全剂量接种疫苗的学生，只要没有 COVID-19/冠状病毒症状，便可立即返校。

# 抗原检测家庭常见问题



在开始自我检测之前，请仔细阅读试剂盒内的说明



按照说明的所有步骤，完成自我检测



使用下方二维码或网址报告您的结果。同时向您的学校报告任何呈阳结果。



[coronavirus.dc.gov/overthecounter](https://coronavirus.dc.gov/overthecounter)

**何为快速抗原检测？** 该检测为快速抗原自我检测，可检测出引发 COVID-19/冠状病毒病的病毒。

**多久能有结果？** 15-30 分钟

**如何得到结果？** 您的结果将在 15-30 分钟内显示在试剂盒内的试剂卡上。

**试剂盒内为何有两个试剂？** 为得到最准确结果，您应进行两次检测。两次检测应间隔至少 36 小时。

**学生是否需检测结果呈阴性才能返校？** 家庭应向其当地教育机构 (LEA) 了解是否需检测结果呈阴性才能返校。

**为何进行检测？** 在返校前进行测试有助于预防学生将 COVID-19/冠状病毒带入学校，并有助于保持学校安全运行。了解您家学生的状况也有助于保护您自己、您的家庭和社区。

**何时进行检测？** 学生应在收到检测后立即进行检测。该检测带有两个鼻拭子，两次使用需间隔 36 小时。您可能很想只用其中一个检测，把另一检测留给日后使用，但请务必为您家学生进行两次检测。

**如果我有问题，该与谁联系？** 对进行检测或检测结果有疑问的家庭应与其所在学校进行联系。